Toxikologie von Blei, Kupfer und Zink

Heike Itter

Ulrike Pabel

Chemische und physikalische Eigenschaften

Kupfer (Cu)

- Übergangsmetall, „Halbedelmetall“, „Schwermetall“ ($< 10 \text{ g/cm}^3$)
- gute Leitung von Wärme und elektr. Strom, Verformbarkeit
- in Natur auch elementar vorkommend
- Oxidationsstufe in biologischen Systemen Cu^{2+} , seltener Cu^{1+} , Cu^0 ...
- Verbindungen z.B.: Kupfersulfat, Kupferoxid...

Zink (Zn)

- Übergangsmetall, unedles Metall, „Schwermetall“ ($< 10 \text{ g/cm}^3$)
- Leitung von Wärme und elektr. Strom, bei Raumtemperatur spröde
- Reaktiv, in Natur nicht elementar vorkommend
- Oxidationsstufe in biologischen Systemen: Zn^{2+} , Zn^0
- Verbindungen z.B.: Zinkchlorid, Zinkoxid, Zinksulfat ...

Blei (Pb)

- Metall, „Schwermetall“ ($> 10 \text{ g/cm}^3$)
- in Natur kaum elementar vorkommend
- hoch dehnbar, formbar, schwach elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig
- Oxidationsstufe in biologischen Systemen Pb^{2+} , seltener Pb^{4+}
- Verbindungen z.B.: Bleicarbonat, Bleiphosphat ...

Physiologische Funktionen und Bedarf

Kupfer (Cu)

- essentielles Spurenelement
- katalytische Funktion (z.B. Cytochrom-C-Oxidase, Superoxid-Dismutase)
- z.B. Wachstum, Knochenstabilität, Blutzellreifung, Eisentransport,...
- **Bedarf:** **Erwachsene** 1,0 - 1,5 mg / Tag
Kinder 0,5 - 1,0 mg / Tag

Zink (Zn)

- essentielles Spurenelement
- katalytische Funktion (z.B. RNA-Polymerase, Glutathionperoxidase, Alkoholdehydrogenase)
- z.B. Wachstum, Wundheilung, Immunabwehr...
- **Bedarf:** **Erwachsene** 10 mg / Tag (**m**), 7 mg / Tag (**w**), 10-11 mg / Tag (**Schwangere, Stillende**)
Kinder 0,5 - 1,0 mg / Tag

Blei (Pb)

- nicht essentiell für den Menschen, d. h.:
 - kein Bedarf,
 - keine physiologische Funktion, kein gesundheitlicher Nutzen und
 - keine Mangelerscheinungen bekannt

Toxikologische Grenzwerte für die Aufnahme

Kupfer (Cu)

- tolerable obere Aufnahmemenge (UL) **5 mg/Tag, Erwachsene**
- tolerable obere Aufnahmemenge (UL) **1-4 mg/Tag, Kinder ab 1 Jahr**, in Abhängigkeit vom Körpergewicht
SCF 2006

Zink (Zn)

- tolerable obere Aufnahmemenge (UL) **25 mg / Tag, Erwachsene**
- tolerable obere Aufnahmemenge (UL) **7-22 mg / Tag, Kinder ab 1 Jahr** in Abhängigkeit vom Körpergewicht
SCF 2006

Blei (Pb)

- keine Aufnahmemenge ohne gesundheitliche Beeinträchtigung bekannt („keine Wirkungsschwelle“)

Toxische Wirkungen beim Menschen – Kupfer (I)

➤ Kinetik

- Absorption v. a. im Dünndarm, geringerer Anteil im Magen
- Prozentsatz der Absorption nimmt mit steigender Zufuhr ab
- Transport in die Leber; dort Speicherung oder Einbau in neusynthetisierte Proteine
- Regulation der Homöostase über einen breiten Aufnahmebereich (0,8-5,5 mg/Tag)
- Exkretion hauptsächlich über die Galle / Faeces

Toxizität ist u.a. abhängig von

- Spezies
- Zink, Eisen, Molybdän in der Diät
- Chemische Verbindung

Toxische Wirkungen beim Menschen – Kupfer (II)

➤ Akute Toxizität

- gastrointestinale Irritationen, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö
- NOAEL **0,0272 mg/kg KG/Tag** (Aufnahmemenge ohne gesundheitl. Beeinträchtigung)
- minimal risk level **0,01 mg/kg KG/Tag** für die Aufnahme mit Trinkwasser **zusätzlich** zu einer normalen Kupferaufnahme mit der Nahrung (ATSDR 2004)
- tödliche orale Dosis 200 mg/kg Körpergewicht (WHO 1993)

➤ Chronische Toxizität

- NOAEL Mensch **10 mg Kupfer/Tag**, Endpunkte Lebereffekte, gastroint. Störungen etc. *FNB 2001*
- Effekte bei chronischer Überversorgung: gastrointestinale Störungen, Zufuhr 15-75 mg
- bei Aufnahme mit Trinkwasser Effekte ab 5-6 mg/Tag
- keine Hinweise auf **Humankanzerogenität**
- keine Hinweise auf **Reproduktionstoxizität** beim Menschen

Kupfer – Toxikologie (III)

➤ Genotoxizität

Datenbasis nicht ausreichend

➤ Kanzerogenität

- keine Hinweise auf Kanzerogenität im Tierversuch
- nur für Kupfer(II)8-hydroxyquinolin IARC Klassifizierung vorhanden:
IARC Gruppe 3 (nicht klassifizierbar bezüglich Kanzerogenität für den Menschen)

➤ Reproduktionstoxizität

im Tierversuch bei hohen Dosen (12 mg/kg und höher)

- Effekte auf Fortpflanzungsorgane (Gewicht/Histologie)
- embryotoxische / fötotoxische Wirkung

Toxische Wirkungen beim Menschen - Zink

➤ Kinetik

- Absorption im Jejunum, Transport an Proteine gebunden
- homöostatische Regulation
- kein spezieller Speicherort bekannt
- Exkretion über den Darm, weniger über die Niere

➤ Akute Toxizität

- gastrointestinale Irritationen, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö
- emetische Dosis 225-450 mg

➤ Chronische Toxizität

- keine Kanzerogenität, Genotoxizität, Teratogenität
- bei gesteigertem Zn-Pool
 - verminderte Cu-Konzentration im Serum, Leber, Niere
 - verringerte Coeruloplasmin-Serumkonzentration und Aktivität kupferabhängiger Enzyme
 - Verminderung der Speicherung von Eisen, Anämie
- NOAEL 50 mg/Tag, kritischer Endpunkt: Kupferstatus

Toxische Wirkungen beim Menschen – Blei

Aktueller Stand der Wissenschaft: EU 2010, WHO 2011

➤ Toxikokinetik

- Absorption im Gastrointestinaltrakt, Kinder > Erwachsene
- Transport im Blut (Erythrocyten) in Organe (Leber, Niere)
- Akkumulation im Knochen (Halbwertszeit 10-30 Jahre)
- Exkretion mit Urin und Faeces

langsame Ausscheidung

➔ für die toxische Wirkung bei Aufnahme von Blei mit der Nahrung steht die chronische Aufnahme vergleichsweise geringer Mengen von Blei im Vordergrund.

➤ Akute Toxizität

Bei einmaliger Aufnahme führen erst vergleichsweise große Mengen von Blei bzw. Bleiverbindungen zu einer **akuten** Bleivergiftung.

Toxische Wirkungen beim Menschen – **Blei**

Aktueller Stand der Wissenschaft: EU 2010, WHO 2011

➤ **Chronische Toxizität**

empfindlichste Endpunkte:

- Entwicklung des **Nervensystems** (Embryos, Feten, Kinder)
 - z. B. im Hinblick auf Aufmerksamkeit, Intelligenzleistungen oder Hörschwellenverschiebung
- Nierentoxizität
 - Reduzierung der Nierenfunktionsleistung
- Herz-Kreislauf-Effekte
 - insbesondere Bluthochdruck
- wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen (IARC 2006; Gruppe 2A)

➔ **keine Aufnahmemenge ohne gesundheitliche Beeinträchtigung bekannt („keine Wirkungsschwelle“)**

Zusammenfassung

Element	Physiologischer Bedarf	Toxikologischer Grenzwert (chronisch)	Kanzerogenität (IARC)
Kupfer	ja	ja	--- Keine Monographie / Klassifizierung bis auf Kupfer(II)8-hydroxyquinol (Gruppe 3)
Zink	ja	ja	--- (Keine Monographie / Klassifizierung)
Blei	nein	keine Aufnahmemenge ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ableitbar	Gruppe 2A (wahrscheinlich humankanzerogen)

➔ entscheidend für den Verbraucher ist die **Höhe der chronischen Bleiaufnahme aus allen Quellen**, zu denen auch mit bleihaltiger Munition erlegtes Wildbret gehören kann

Kernaussagen

- als essentielle Spurenelemente erfüllen **Kupfer** und **Zink** katalytische Funktionen als Bestandteil vieler Enzyme
- erst eine chronisch erhöhte Aufnahme von mehr als 5 mg/d (upper intake level, UL, für Erwachsene) kann bei **Kupfer** zu gastrointestinalen Störungen und Lebertoxizität führen
- **Blei** besitzt keine physiologischen Funktionen und ist in jeder noch so geringen Aufnahmemenge als toxisch anzusehen

Risiken erkennen – Gesundheit schützen

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Bundesinstitut für Risikobewertung

Max-Dohrn-Strasse 8-10 • D-10589 Berlin

Tel. 0 30 - 184 12 - 0 • Fax 0 30 - 184 12 - 47 41

bfr@bfr.bund.de • www.bfr.bund.de